Universidad de Huelva

UNIDAD ASOCIADA CSIC-UHU
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

*Evolución y situación actual de la
calidad del aire de Granada
Seminarios Miradas al Mundo 8/2/17*

Imagen 31/12/2016 ©@DavidMeteoo

8-10-14

Granada, entre las áreas más afectadas de España por la contaminación del aire

El 35,6% de españoles respira aire contaminado, que provoca 20.000 muertos al año, 12 veces más que el tráfico

EUROPA PRESS GRANADA

8 octubre 2014
12:50

La Bahía de Algeciras (Cádiz), Granada o Huelva se encuentran entre los puntos de la geografía española más afectados por los niveles de contaminación del aire, con presencia de partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno (NO₂) y dióxido de azufre (SO₂), según el informe 'La calidad del aire en el Estado español 2013', presentado este miércoles por Ecologistas en Acción.

Oferplan | Coches | Pisos | Empleo | Descuentos

IDEAL

23-6-15

El Independiente de Granada

Alguien tiene que contarlo

Gre

INICIO POLÍTICA E+I+D+I CIUDADANÍA CULTURA IMPLICADOS COMUNICACIÓN

INFORME ESTATAL DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

En Granada se respira un aire perjudicial para la salud por la contaminación del tráfico

CIUDADANÍA - IndeGranada - Martes, 23 de Junio de 2015

contaminación

En Granada, es especial en el área metropolitana se respiró en 2014 un aire perjudicial para la salud al sobrepasar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mayoría de índices de los principales contaminantes, según el informe anual correspondiente a 2014 elaborado por Ecologistas en Acción que atribuye al alta contaminación atmosférica en Granada al tráfico. Pero los índices registrado son similares al resto de Andalucía y a la mayor parte de España.

NOTICIAS RELACIONADAS

Vamos Granada pide una apuesta por un plan de transporte público metropolitano como primera medida en la convocatoria de la Comisión de Calidad del aire

La capital elabora un plan de mejora de la calidad del aire que elude medidas polémicas como prohibir el uso del vehículo privado

Granada es la capital andaluza

Antecedentes científicos

Atmospheric Environment 89 (2014) 593–602

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Atmospheric Environment

journal homepage: www.elsevier.com/locate/atmosenv

Identification of fine (PM_{10}) and coarse (PM_{10-1}) sources of particulate matter in an urban environment

G. Titos ^{a,b,*}, H. Lyamani ^{a,b}, M. Pandolfi ^c, A. Alastuey ^c, L. Alados-Arboledas ^{a,b}

^a Department of Applied Physics, Sciences Faculty, University of Granada, 18071 Granada, Spain

^b Andalusian Institute for Earth System Research, IISTA-CEAMA, University of Granada, Junta de Andalucía, Granada 18006, Spain

^c Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDÆA), Department of Geosciences, CSIC, Barcelona, Spain

Antecedentes

Environ Earth Sci (2011) 63:1433–1445
DOI 10.1007/s12665-010-0657-5

SPECIAL ISSUE

Characterization of indoor and outdoor atmospheric pollutants impacting architectural monuments: the case of San Jerónimo Monastery (Granada, Spain)

Velichka Kontozova-Deutsch · Carolina Cardell ·
Maja Urosevic · Encarnación Ruiz-Agudo ·
Felix Deutsch · René Van Grieken

Received: 15 April 2010 / Accepted: 5 July 2010 / Published online: 20 July 2010
© Springer-Verlag 2010

Science of the Total Environment 414 (2012) 564–575

Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Science of the Total Environment

journal homepage: www.elsevier.com/locate/scitotenv

Black soiling of an architectural limestone during two-year term exposure to urban air in the city of Granada (S Spain)

Maja Urosevic ^{a,*}, Africa Yebra-Rodríguez ^b, Eduardo Sebastián-Pardo ^a, Carolina Cardell ^a

^a Dept. Mineralogy and Petrology, Faculty of Science, University of Granada, Campus Fuentenueva s/n, 18071 Granada, Spain

^b Dept. Geology-Associated Unit IACT (CSIC-UGR), Faculty of Experimental Science, University of Jaén, Campus Las Lagunillas s/n, 23071 Jaén, Spain

Journal of Hazardous Materials 324 (2017) 213–220

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Hazardous Materials

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jhazmat

Antimony speciation as geochemical tracer for anthropogenic emissions of atmospheric particulate matter

Daniel Sánchez-Rodas^{a,b,*}, Louay Alsioufi^a, Ana M. Sánchez de la Campa^{a,c}, Yolanda González-Castanedo^a

^a Center for Research in Sustainable Chemistry—CIQSO, Associate Unit CSIC-University of Huelva “Atmospheric Pollution”, Huelva, Spain

^b Department of Chemistry, Faculty of Experimental Sciences, University of Huelva, Huelva, Spain

^c Department of Mining, Mechanics and Energetic Engineering, ETSI, University of Huelva, Spain

HIGHLIGHTS

- Geochemical anomalies of toxic elements in PM10 related to metallurgy have been identified in an urban ambient.
- Fugitive emissions from brass industries are an important source of metals and metalloids.
- Speciation of Sb(III) and Sb(V) in PM10 can be used as a geochemical tracer to identify the influence of industry and traffic on the air quality.

GRAPHICAL ABSTRACT

12-1-17

Oferplan | Coches | Pisos | Empleo | Descuentos

Granada cerró 2016 como la única capital andaluza que superó los límites de polución

La estación de Granada-Norte lleva una década rebasando el valor límite de cuarenta microgramos de No2 contemplado en la normativa

JORGE PASTOR | GRANADA

@jorgePastorS 12 enero 2017 02:44

20

52

Fíjense en la foto de la derecha. En primer plano, el monasterio de San Jerónimo. Al fondo, esa especie de neblina que ha echado raíces en Granada. Que unos días

La boina de contaminación es perfectamente perceptible en Granada. / FERMÍN RODRÍGUEZ

Red Calidad del Aire de Granada

Zona de estudio

Estación Granada Norte Avda Luis Miranda

Zona de estudio

Estación Granada Norte “hot-spot” tráfico

Zona de estudio

PROMEDIO ANUAL - AÑO 2016										PM10		
Estación (µg/nPROVINCIA)	SO2	CO	NO	NO2	NOx	PM10	O3	NO2+O3	>VLD	SAH	ANTROP	
FONDO RURAL												
MATALASCAÑAS	Huelva	4		4	4	8	19	71	75	2	2	0
SIERRA NORTE	Sevilla	4		3	2	5	19	63	65	13	13	0
ALCORNOCAL	Cádiz	6		7	2	9	24			0	0	0
VVA ARZOBISPC	Jaén		518				32			49	19	30
FONDO URBANO												
SAN FERNANDO	Cádiz	9	259	4	13	19	19	65	78	5	5	0
FONDO URBANO + INDUSTRIAL												
LEPANTO	Córdoba	4	517	8	21	31	24	54	75	15	15	0
CAMPUS	Huelva	8	577	5	12	17	22	63	74	3	0	3
MOGUER	Huelva	5		5	19	25	35			51	51	0
BAILÉN	Jaén	5		6	19	19	36			73	55	18
LA LÍNEA	Cádiz	10		11	26	42	29	62	89	18	18	0
PLAZA CASTILLO	Almería	9		3	11	16	33			20	11	9
ALCALÁ GUAD.	Sevilla	7	328	5	18	24	30	63	80	30	30	0
TRÁFICO HOT SPOT												
PRÍNCIPES	Sevilla	6	420	10	25	40	27			17	17	0
GRANADA NORT	Granada	7	611	29	44	88	30			27	24	3
MEDITERRÁNEO	Almería	8	371	11	23	39	29	62	86	8	8	0
RONDA DEL VAL	Jaén	4	298	10	22	35	25	67	89	23	23	0
CARRANQUE	Málaga	9		15	30	47	22	58	88	9	5	0
Límite horario		350 (24)			200 (18)							
Límite diario		125 (3)				50 (35)						
Límite anual				40		40						
() número de veces y según EC/50/2008

Estación Granada Norte

Estación Granada Norte

Granada Norte años 2012-2016

■ PM₁₀
 ■ NO₂
 ■ SO₂

mean and 95% confidence interval in mean

$\mu\text{g}/\text{m}^3$	año 2007	año 2008	año 2009	año 2010	año 2011	año 2012	año 2013	año 2014	2007-2014
CO	805	668	556	519	408	414	443	415	529
NO	33	27	27	29	32	31	28	28	29
NO ₂	45	41	45	47	48	46	40	42	44
NO _x	99	85	86	91	96	93	82	84	89
O ₃	45	48	46	49	43	16			41
PM10	55	40	39	38	36	32	25	30	37
SO2	13	12	10	9	9	8	6	8	9
F	1,01	1,05	1,04	1,01	1,15	1,19	1,17	0,99	
PM10 * F	56	42	41	39	42	38	30	30	40
PM10>50	122	108	100	77	75	75	36	36	79
PM10>50 sah	57	53	51	41	33	35	10	21	38
PM10>50 ant	65	55	49	36	42	40	26	15	41

Tabla de promedios anuales de gases contaminantes y PM10. F factor de intercomparación equivoi manual y automático. PM10>50, PM10 >50 sah y PM10 >50 ant: número de días superior a Valor Límite Diario VLD ($50\mu\text{g}/\text{m}^3$) según EU50/2008, debido a días saharianos y antropogénicos respectivamente.

Contaminantes: 2007-2014 Granada Norte

NO₂ PM₁₀ SO₂

Variación estacional promedio mensual

PM10 en estaciones representativas de Andalucía Oriental

Viz: Viznar

Gra: Granada N

Ron: Ronda de Valle (Jaén)

Med: Mediterráneo (Almería)

Bai: Bailén (Jaén)

Componentes mayoritarios Granada Norte

	PM2.5	PM10	PM2.5/PM10		PM2.5	PM10	PM2.5/PM10
Nº muestras	292	420			352	480	
Año	2009-2014	2007-2014		Año	2009-2015	2007-2015	
$\mu\text{g}/\text{m}^3$				ng/m^3			
Concentración	22,4	39,9	0,6	Li	0,34	0,72	0,5
C _{total}	6,36	9,92	0,6	Be	0,09	0,03	1,0
C _{org}	5,66	8,62	0,7	Sc	0,07	0,16	0,5
C _{nm}	6,38	9,97	0,6	Ti	21,2	38,6	0,5
CO ₃ ²⁻	2,30	5,56	0,4	V	6,35	11,18	0,6
SiO ₂	2,04	5,20	0,4	Cr	2,31	4,56	0,5
Al ₂ O ₃	0,68	1,73	0,4	Mn	6,97	11,70	0,6
Ca	1,11	2,74	0,4	Co	0,52	0,67	0,8
K	0,37	0,60	0,6	Ni	5,84	8,14	0,7
Na	0,22	0,61	0,4	Cu	30,4	63,5	0,5
Mg	0,26	0,58	0,4	Zn	25,1	36,4	0,7
Fe	0,34	1,01	0,3	Ga	1,16	1,34	0,9
PO ₄ ³⁻	0,06	0,14	0,4	Ge	0,09	0,08	1,2
SO ₄ ²⁻	1,78	2,43	0,7	As	0,29	0,58	0,5
F ⁻	<0,01	<0,01		Se	0,17	0,22	0,8
SO ₄ ²⁻ nss	1,73	2,28	0,8	Rb	0,68	1,54	0,4
SO ₄ ²⁻ ss	0,06	0,15	0,4	Sr	4,44	10,1	0,4
NO ₃ ⁻	0,84	2,38	0,4	Y	0,26	0,34	0,8
Cl ⁻	0,06	0,30	0,2	Zr	3,17	3,50	0,9
NH ₄ ⁺	0,43	0,58	0,8	Nb	0,08	0,20	0,4
				Mo	6,87	5,77	1,2
				Cd	0,14	0,13	1,0
				Sn	1,73	5,11	0,3
				Sb	1,33	3,86	0,3
				Cs	0,47	0,11	1,0
				Ba	33,1	36,9	0,9
				REE	1,20	2,56	0,5
				Hf	0,12	0,15	0,8
				Ta	0,01	0,02	0,3
				W	0,03	0,08	0,4
				Tl	0,10	0,09	1,1
				Pb	3,87	5,99	0,6
				Bi	0,08	0,19	0,5
				Th	0,07	0,15	0,5
				U	0,09	0,08	1,0

As, Ni, Cd y Pb no superan directivas europeas 6, 20, 5, 500 ng/m³

PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %

Componentes principales años 2007-2014

Evolución anual mayoritarios

PM10

PM2.5

Evolución anual elementos traza

PM10

PM2.5

Evolución anual PAH

- BaP_{eq}: benzo[a]pireno equival.
- DahA: dibenzo[a,h]antraceno
- BaP: benzo[a]pireno
- BbF: benzo[b]fluoranteno
- BkF: benzo[k]fluoranteno
- BaA: benzo[a]antraceno
- IcdP: indeno[1,2,3,c,d]pireno

Ejemplo 21 de febrero de 2016

NOAA HYSPLIT MODEL
Backward trajectories ending at 1200 UTC 21 Feb 16
GDAS Meteorological Data

Wind @ 850hPa + Mean Sea Level Pressure

Wind @ Surface + Dust Extinction (AOT)

Ejemplo 21 de febrero de 2016

Ejemplo 21 de febrero de 2016

Comparativa Granada N vs Andalucía 2007-2014

**Granada Norte 2007-2014
PM10 (µg/m³) source contribution**

**Granada Norte 2009-2014
PM2.5 (µg/m³) source contribution**

**Andalucía 2007-2014
PM10 (µg/m³) source contribution**

Contribución de fuentes PM10

Contribución de fuentes PM10

17 de mayo 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 92 página 27

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ACUERDO de 19 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire.

Granada Hoy

1-2-17

GRANADA

[GRANADA](#) [ANDALUCÍA](#) [PANORAMA](#) [GRANADA CF](#) [ACTUAL](#) [OPINIÓN](#)

[≡ TODAS LAS SECCIONES](#)

GRANADA

Granada sitúa en el 'horizonte 2020' el plan de choque contra la contaminación

- El Ayuntamiento diseña un proyecto para reducir las emisiones que contempla la creación de parkings disuasorios a la entrada de la ciudad y un plan de inspección de calderas

- En el caso de Granada Norte según el PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA (Decreto 231/2013) y en relación a NO_2 y PM_{10} , las actuaciones deben estar dirigidas a un mayor control del tráfico rodado en la ciudad.

Atmospheric Environment 114 (2015) 19–31

Evaluation of the impact of transportation changes on air quality

G. Titos ^{a, b, *}, H. Lyamani ^{a, b}, L. Drinovec ^c, F.J. Olmo ^{a, b}, G. Močnik ^c,
L. Alados-Arboledas ^{a, b}

^a Department of Applied Physics, Sciences Faculty, University of Granada, 18071, Granada, Spain

^b Andalusian Institute for Earth System Research, Centro Andaluz de Medio Ambiente (CEAMA), University of Granada, 18006, Granada, Spain

^c Aerosol d.o.o., Ljubljana, Slovenia

H I G H L I G H T S

- Effect of air quality plans on black carbon concentrations has been evaluated.
- Black carbon concentrations were reduced by limiting traffic to public transport.
- Reorganization of bus routes and renewal of the bus fleet improve air quality.

Contents lists available at ScienceDirect

Science of the Total Environment

journal homepage: www.elsevier.com/locate/scitotenv

Spatial and temporal variability of carbonaceous aerosols: Assessing the impact of biomass burning in the urban environment

G. Titos ^{a,b,*}, A. del Águila ^a, A. Cazorla ^{a,c}, H. Lyamani ^a, J.A. Casquero-Vera ^{a,c}, C. Colombi ^d, E. Cuccia ^d, V. Gianelle ^d, G. Močnik ^{e,f}, A. Alastuey ^b, F.J. Olmo ^{a,c}, L. Alados-Arboledas ^{a,c}

^a Andalusian Institute for Earth System Research, IISTA-CEAMA, University of Granada, Junta de Andalucía, Granada 18006, Spain
^b Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA), Department of Geosciences, CSIC, Barcelona, Spain
^c Department of Applied Physics, University of Granada, Granada 18071, Spain
^d ARPA Lombardia, Settore Monitoraggi Ambientali, Milano, 20124, Italy
^e Aerosol d.o.o., Research and Development Department, Ljubljana, Slovenia
^f Department of Condensed Matter, Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

HIGHLIGHTS

- Biomass burning impact in southern Europe urban air quality sparsely investigated.
- Levoglucosan tracer and online real-time Aethalometer methods have been applied.
- High contribution of biomass burning during winter in the suburban area.
- Lower contribution of biomass burning in the city center.

GRAPHICAL ABSTRACT

- Quema de biomasa.

- **FUTURO: Participación y compromiso de todos los actores:**

- Administración regional y local.
- Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada.
- Científicos y técnicos (e.g. epidemiólogos y calidad del aire).
- Sector industrial y energético
- Vecinos.

Ayuntamiento de Granada

merca2.es

Dr. Querol (CSIC): "No es ser ecologista, es una cuestión de salud pública"

30/12/2016

- Información online: poder de decisión del ciudadano.
- Políticas y planificación de urbanismos integrarlas con criterios de calidad del aire.
- Mucha comunicación y didáctica sobre calidad del aire.

Agradecimientos

- Xavier Querol, Andrés Alastuey e IDAEA, Izaña-AEMET, CIEMAT y EEZ por su apoyo científico, técnico y humano durante los últimos 18 años.
- Ministerio de Economía y Competitividad MINECO. Proyecto CGL2011-28025 y CGL2014-54637-P
- Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía Proyecto 10/2013/PC/00.
- Consejería de Innovación Ciencia Empresa y Empleo Junta de Andalucía Project 2011 RNM 7800.

Universidad de Huelva

UHUAEROSOL

[@UHUAerosol](https://twitter.com/UHUAerosol)

Evolución y situación actual de la calidad del aire de Granada Seminarios Miradas al Mundo 8/2/17

Muchas gracias por su atención

UNIDAD ASOCIADA CSIC-UHU
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Jesús D. de la Rosa jesus@uhu.es

<http://uhuaerosol.blogspot.com.es/>

TT: @UHUAerosol

Imagen 31/12/2016 ©@DavidMeteoo