



La menstruation ne doit plus  
survenir lors du pèlerinage  
à La Mecque.



Eugynon · Primolut N



# Eugynon Primolut N

Il peut être nécessaire de tenir compte du temps de la menstruation dans des circonstances particulières, telles que:

pèlerinage à La Mecque  
obligations religieuses  
activités sportives  
opérations chirurgicales  
voyages  
examens  
événements sociaux etc.

L'hémorragie menstruelle est due à une chute de la sécrétion d'œstrogènes et de progestérone par les ovaires.

La menstruation peut, de ce fait, être retardée ou avancée selon la date désirée et de manière sûre par l'administration des hormones sexuelles féminines, sans provoquer d'effets secondaires désagréables.

## Pour retarder la date de la menstruation



**avec Eugynon:**

1 dragée par jour, en commençant 3 jours avant la date prévue de la menstruation. L'hémorragie débutera 2-3 jours après l'arrêt de la médication. Le décalage de la menstruation ne doit pas dépasser une semaine.

La patiente, sous thérapeutique cyclique par l'Eugynon, peut retarder l'hémorragie en continuant la prise des dragées pendant environ une semaine.

**avec Primolut N:**

1 comprimé 3 fois par jour, en commençant au plus tard 3 jours avant la date prévue de la menstruation. L'hémorragie menstruelle se produit 2-3 jours après l'arrêt de la médication. Le décalage de la menstruation ne doit pas dépasser une semaine.

## Pour avancer la date de la menstruation



**avec Eugynon:**

A partir du 5ème jour du cycle, on prend une dragée par jour pendant 8 jours au moins. Cesser le traitement 2 ou 3 jours avant la date souhaitée pour la menstruation.

Pour informations détaillées sur administration, mode d'action, recommandations spéciales et contre-indications veuillez consulter les brochures scientifiques ou les modes d'emploi.

# Eugynon

**Présentation** 21 dragées à 0,5 mg de norgestrel et 0,05 mg d'éthinyl-œstradiol.

# Primolut N

**Présentation** 30 comprimés à 5 mg de noréthistérone.



Schering AG Berlin