



NEO - LYNDIOL

OVULOSTATICO ORAL DE DOSIS EQUILIBRADA
NI TANTO NI TAN POCO

NEO-LYNDIOL gracias a su perfecto equilibrio entre el componente estrogénico y el progestativo, consigue una notable disminución de efectos secundarios, y aún éstos, de presentarse en el primer ciclo, tienden a desaparecer en los ciclos siguientes.

Composición por comprimido:	Lynestrenol Ethinilestradiol Excipiente c. s. p. Envase calendario P. V. P. 68,10 Ptas.	2,5 mg. 50 mcg. 100 mgr. 22 comprimidos.
Indicaciones	Ovulostasis. Reposo del ovario según prescripción médica.	
Contraindicaciones	Tumores estrógeno-dependientes.	
Incompatibilidades	No se conoce ninguna.	
Efectos secundarios	En raros casos, al iniciarse el tratamiento, puede experimentarse ligeras náuseas y sensación de tensión mamaria. En la mayoría de los casos estas molestias desaparecen al cabo de unos días, especialmente si los comprimidos son ingeridos por la noche.	
Tolerancia	El NEO-LYNDIOL es bien tolerado. En mujeres epilépticas, diabéticas, con antecedentes de enfermedad hepática o con riesgo de tromboflebitis (p. ej. mujeres con varices), la administración de NEO-LYNDIOL hace necesario un riguroso control médico durante el tratamiento.	
Posología	El primer comprimido se deberá tomar la noche del 5.º día del ciclo, contando como primer día del ciclo el día que comienza la menstruación. En los días siguientes, cada noche un comprimido ininterrumpidamente hasta completar la serie de 22 comprimidos. Después se descansará seis días y se iniciará nuevamente el tratamiento.	



ORGANON ESPAÑOLA, S. A. - Apartado 43 - San Baudilio de Llobregat - Barcelona