

25. FEB 1976

Esta es una
de las muchas
mujeres
que necesitan
ayuda



Muchas mujeres tienen que compaginar su trabajo con las tareas propias del hogar. Ello no siempre es fácil. Sobre todo si no pueden llevar a cabo una planificación familiar eficiente.


De aquí que la ayuda del médico sea decisiva. Pues sólo el médico puede recomendar el método o preparado que ofrezca la mayor seguridad contraceptiva.

Neogynon el ovulistático oral de seguridad prácticamente absoluta

Neogynon ofrece la máxima seguridad ya desde el primer ciclo de tratamiento. Su acción se ejerce a través de un triple mecanismo cuyos efectos parciales, totalmente reversibles al suspender la medicación, se complementan en cada ciclo de tratamiento, asegurando la eficacia terapéutica.

La acción periférica y central de Neogynon ha sido comprobada en un estudio clínico con pacientes que presentaban ciclos regulares antes del tratamiento. Los resultados muestran que **“ya en el primer ciclo de tratamiento falta la ovulación,** además de observarse una fuerte inhibición periférica en los receptores estrogénicos. En las pacientes estudiadas pudo constatarse, por tanto, una completa acción contraceptiva desde la iniciación del tratamiento”.*

* Spona, J., Schneider, W. y Matt, K., Med. Klin. 68, 16:505-509 (1973)



Parámetros correspondientes al triple mecanismo de seguridad en el ciclo de control y durante el 1^{er} ciclo de tratamiento con Neogynon



Neogynon
ayuda a la mujer
a ser una mujer
de hoy

Schering Archives - Bayer AG

Neogynon Neogynon CD Ovulstáticos orales combinados

Composición

Cada gragea de Neogynon y cada gragea activa de Neogynon CD contiene 0,25 mg de d-norgestrel y 0,05 mg de etinilestradiol.

Indicación

Regulación hormonal de la fertilidad.

Contraindicaciones

Trastornos graves de la función hepática; ictericia idiopática o prurito grave en embarazos anteriores; síndrome de Dubin-Johnson; síndrome de Rotor; procesos tromboembólicos curados o en actividad; anemia de células falciformes; carcinoma de mama o de útero tratado o actual; trastornos del metabolismo graso; historia de herpes gravídico; otosclerosis que empeoró en embarazos anteriores.

Efectos secundarios

Mareos; dolores de cabeza; jaqueca; alteraciones de la vista; cloasma; variaciones del peso, de la libido, de los valores bioquímicos normales y de las pruebas de laboratorio; en mujeres predispuestas pueden presentarse excepcionalmente manifestaciones de virilización.

Observaciones

Antes de iniciar el tratamiento, exploración ginecológica completa, incluida la mama; determinación de glucosa en orina y medición de la presión sanguínea. Durante el tratamiento, exámenes de control en intervalos de 6 meses.

Ante trastornos de la función hepática deben realizarse las correspondientes pruebas funcionales cada 8 a 12 semanas.

Las mujeres con enfermedades que pueden empeorar durante la gestación deben ser mantenidas bajo observación médica.

En mujeres hipertónicas solamente deberán emplearse ovulstáticos orales cuando exista estricta indicación médica.

La administración regular de otros medicamentos (p.ej., barbitúricos, hidantoínas, rifampicina) puede reducir el efecto ovulstático.

Motivos para interrumpir inmediatamente la medicación

Aparición por primera vez de dolores de cabeza similares a los de la jaqueca o frecuente presentación de cefaleas de intensidad no habitual. Cualquier alteración visual. Signos

iniciales de tromboflebitis o tromboembolias. Aparición de ictericia (colestasis). Cuatro semanas antes de la fecha planeada de una operación. Inmovilidad, p.ej. a causa de un accidente. Aumento de la presión arterial. Embarazo.

Modo de empleo y dosificación

Neogynon:

A partir del 5º día de la menstruación una gragea diaria durante 3 semanas (21 días). A continuación se intercala 1 semana (7 días) de descanso y se reanuda seguidamente el tratamiento.

En las mujeres con ciclo acortado (26 días o menos) o con ciclo irregular, se recomienda comenzar el tratamiento a partir del primer día de la menstruación.

Todos los ciclos de tratamiento se inician siempre el mismo día de la semana.

Neogynon CD:

El tratamiento se comienza el primer día de la menstruación, tomando de la zona roja del envase-calendario la gragea del día de la semana correspondiente. Después se continúa sin interrupción tomando una gragea cada día todo el tiempo que se desee.

Para una información más completa consúltense nuestros impresos más detallados.

Presentación

Neogynon:

Envase-calendario con 21 grageas

Neogynon CD:

Envase-calendario con 28 grageas
(21 grageas activas y 7 grageas placebo)

SCHERING AG BERLIN/BERGKAMEN



QUÍMICA SCHERING
COLOMBIANA, S.A.