

# neogynona



mínima  
dosificación

máxima  
aceptabilidad

el nuevo ovulístico oral  
que amplía una línea de proverbial efectividad

La hormonoterapia actual  
tiende a conseguir la máxima efectividad  
empleando la mínima dosis posible.

Schering AG Berlin/Bergkamen, de acuerdo con  
esta tendencia, presenta un nuevo preparado que alcanza  
la efectividad ya proverbial en la línea  
de ovulísticos más recetada en el  
mundo, empleando para ello auténticas  
microdosis hormonales.

# neogynona

Ningún otro ovulístico oral  
contiene dosis más reducidas  
de gestágeno y de estrógeno.

# neogynona


su proverbial efectividad no necesita destacarse

## Mínima dosificación

Neogynona contiene auténticas microdosis hormonales: 0,25 mg de d-norgestrel y 0,05 mg de etinilestradiol.

La dosis de gestágeno es la más reducida entre las empleadas hasta la fecha en ovulistas hormonal.

La cantidad de estrógeno por gragea corresponde a la dosis señalada recientemente por diversos organismos internacionales como la más recomendable para practicar este tipo de tratamiento.



## Máxima aceptabilidad

En los ensayos clínicos realizados durante 13.029 ciclos-pudo demostrarse la aceptación casi unánime de Neogynona por las 871 mujeres que participaron en los ensayos.

En el 96,6% de los casos se comprobó la excelente tolerancia del preparado, lo que, unido a su perfecta capacidad para controlar el ciclo, se traduce en un grado de aceptabilidad clínica difícilmente superable.

96,6%

3,4%

En la ovulistas oral no hay razón para administrar dosis hormonales superiores a las absolutamente imprescindibles.

# neogynona

se presenta en el envase-calendario  
original de Schering AG Berlin/Bergkamen

El tratamiento se comienza el 5º día del ciclo menstrual, es decir,  
5 días después de iniciada la menstruación, haya terminado o no la hemorragia.

A continuación se toma una gragea diaria, preferentemente por  
las noches a continuación de la última comida, hasta terminar el envase.

Terminado el envase se intercala 1 semana de descanso, después de la cual  
se reanuda la toma de las grageas. Durante esta semana deberá presentarse la hemorragia.

La seguridad del efecto terapéutico sólo puede  
obtenerse si se cumplen correctamente las instrucciones señaladas.

## Composición

21 grageas, cada una con d-norgestrel 0,25 mg y etinilestradiol 0,05 mg.

Para una información más completa sobre NEOGYNONA (acción, dosificación, observaciones,  
contraindicaciones), consúltense nuestros impresos más detallados.

Schering AG  
Berlin/Bergkamen



Schering  
España, S. A.